

17-latka po szczepionce Gardasil dostała paraliżu

30 stycznia 2018

17-letnia Nicole El-Safty z miejscowości Clacton w hrabstwie Essex (Anglia Wschodnia), po szczepionce Gardasil przeciw HPV (brodawczakowi ludzkiemu podejrzanemu m.in. o wywoływanie raka macicy) ciężko zachorowała. Uważa ona, że właśnie przez to szczepienie dostała paraliżu.

Dziewczyna kilka miesięcy po zaszczepieniu dostała zaczęła mieć różne objawy chorobowe, których nie rozumiała. Lekcje tańca, które pobierała, musiała przerwać ponieważ nie mogła się ruszać. Szczepienie wywołuje obawy tysięcy nastolatków. Nicole nie jest jedyną Angielką która dostała paraliżu po szczepieniu.

Pracownicy służby zdrowia zaprzeczają jakoby szczepionka mogła powodować paraliż, choć potwierdzają występowanie innych skutków ubocznych, jak bóle głowy, gorączka i nudności, które mogą być objawami zatrucia.

Szczepionkę Gardasil otrzymują dziewczęta w wieku 12-18 lat w ramach zaleceń opieki zdrowotnej brytyjskiej służby zdrowia NHS. W USA szczepionkę otrzymują młodzi chłopcy, którzy są także narażeni na choroby spowodowane brodawczakiem.

W wywiadzie dla dziennika „Daily Mail” El-Safty, która ma obecnie 22 lata, powiedziała: „Z osoby całkowicie sprawnej i zdrowej w każdym względzie stałam się osobą unieruchomioną, nie mogę się ruszać. Pewnego dnia zobaczyłam w telewizji nagłówek alarmujący o wpływie wirusa HPV. Miałam wszystkie objawy, w tym problemy z sercem, ciężkie wrzody i paraliż. Potem dowiedziałam się, że także jest prawdopodobna niepłodność. Nadal zajmuję się lokalną polityką i studiuję prawo, ale moim głównym celem jest ostrzeganie innych dziewczyn o tym szczepieniu. To niebezpieczne i przerażające.”

W marcu 2014 roku w kilka miesięcy po otrzymaniu szczepionki zalecanej przez NHS została unieruchomiona w łóżku i cierpiała ogromny ból, ataki lęku i bezradność. „Przez wiele miesięcy wracałam do szpitala i go opuszczałam nie wiedząc, co powoduje chorobę. W końcu postawiono diagnozę rwy kulszowej, ale to nie miało sensu” – mówi El-Safty.

Przed chorobą El Safty była bardzo zwinna i spędzała wiele godzin na tańcu. Ćwiczyła po 18 godzin tygodniowo aby zostać profesjonalną tancerką. Kiedyś poznała 28-letniego chłopaka o imieniu Matt, który stał się jej podporą. Ale jej stan zdrowia się pogarszał i po chwilach radości w jej prywatnym życiu sprawy się pogorszyły. „Ból spływał po ramieniu i promieniował do pleców. Moja twarz zaczęła wyglądać jak po paraliżu. To było przerażające” – wspomina El-Safty. Dziewczyna musiała zaprzestać swoich ulubionych zajęć z tańca. Bóle trwały po 24 godziny i musiała poruszać się na wózku. Pojawiły się poważne problemy żołądkowe, przepukliny, zaniki pamięci.

Kiedy El-Safty zobaczyła program o skutkach ubocznych brania szczepionki Gardasil, nie mogła uwierzyć, bo lista objawów całkowicie pasowała do jej sytuacji zdrowotnej. Zrozumiała, że to nie jest rwa kulszowa.

El-Safty jest obecnie członkiem facebookowej grupy „Parents of sons and daughters suffering illnesses after HPV vaccine”. W jednym z postów wspomniała, że to nieuleczalna choroba, ale jej dwie koleżanki nie miały tyle szczęścia co ona i zmarły.

Źródło: Brytol.com