

36 dzieci zmarło po podaniu szczepionki

19 grudnia 2012

Poufny dokument GlaxoSmithKline, który niedawno wyciekł do prasy wskazuje na to, iż w ciągu dwóch lat, w sumie 36 dzieci zmarło po otrzymaniu szczepionki 6-w-1 Infanrix hexa. Zgodnie z Initiative Citoyenne, która podała informacje, 1271-stronicowy dokument ujawnił, że GlaxoSmithKline otrzymało łącznie 1742 raportów nt. niepożądanych działań w okresie od 23.10.2009 r. do 22.10.2011 r., w tym 503 niepożądanych reakcjach i 36 zgonów.

Initiative Citoyenne stwierdza iż: „GSK nie odnotowało jak pierwotnie liczyliśmy 14 zgonów w okresie od października 2009 r. do października 2011, ale 36 (14 od 2010 do 2011 r. i 22 z 2009 na 2010). Oprócz tych 36 ofiar śmiertelnych, miało miejsce co najmniej 37 innych zgonów (głównie nagła śmierć), co w sumie daje, przynajmniej 73 ofiary śmiertelne od czasu wdrożenia szczepionki w 2000. I znowu, dotyczy to jedynie śmierci przez nagłą śmierć, gdzie brak dalszych informacji nt. zaniżania raportów”.

36 zgonów w okresie dwóch lat, to średnio 1,5 zgonów na miesiąc, co przy jakimkolwiek standardzie jest bardzo wysoką liczbą. Pamiętajmy, że tylko od 1 do 10% niepożądanych reakcji na szczepionki jest rzeczywiście zgłaszanych. Dlatego też w rzeczywistości, problem może być potencjalnie o wiele bardziej poważny a rzeczywista liczba zgonów znacznie wyższa.

Wykresy pokazują, że wiele z tych dzieci, które zmarły, odeszły w ciągu kilku pierwszych dni po otrzymaniu szczepionki. łącznie zgłoszono, iż trzy niemowlęta zmarły w ciągu godziny od otrzymania szczepionki. Ta tragedia nie dziwi po przeczytaniu listy składników wymienionych na ulotce informacyjnej GSK Infanrix Hexa, z którą rodzice rzadko kiedy

mają szansę się zapoznać przed szczepieniem. Szczepionka zawiera niezakaźne substancje z tężcem, bakterie błonicy, oczyszczone białka bakterii krztuśca, białka powierzchniowe wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg, wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanych drożdży) i inaktywowane polio.

Każda dawka 0,5 ml zawiera toksoid błonicy, toksoid tężcowy, toksoid krztuścowy, nitkowate hemaglutyniny, pertaktynę, rekombinowane białko HBsAg (GM0), wirusy polio typu 1, 2 i 3, oczyszczony polisacharyd Hib kowalencyjnie związany z toksoidem tężcowym, wodorotlenek glinu, fosforan glinu, 2-fenoksyetanol, laktozę, medium 199, neomycynę, polimyksynę, polisorbat 20 i 80, chlorek sodu i wodę.

W interesującym artykule autorstwa dr Harolda Buttrama zatytułowanym „Ostateczna gra: Czy Szczepionki podawane dzieciom prowadzą do hybrydyzacji z obcymi ludzimi i zwierzęcymi częściami DNA?” podkreślił problemy związane z tylko dwoma z tych składników, w tym aluminium, które jest neurotoksyną związaną z chorobą Alzheimera, i drgawkami oraz formaldehydem, który jest znanym środkiem rakotwórczym powszechnie stosowanym w balsamowaniu zwłok.

Dr Harold Buttram również stwierdził: „Jest powszechnie znanym wśród toksykologów, że kombinacje substancji toksycznych mogą przynieść wykładniczy wzrost toksyczności, czyli np dwie toksyczne substancje w połączeniu, spowodują dziesięciokrotne lub nawet stu-krotne zwiększenie toksyczności. Klasycznym przykładem takiej zasady było badanie Schuberta, w którym odkryto, że gdy podano oddzielnie pewną ilość ołowiu i rtęci to 1 procent badanych szczurów poniósł śmierć, natomiast kiedy podano obie substancje razem to 100 procent badanych szczurów poniosło śmierć. W szczepionkach zasada ta stosuje się przynajmniej do aluminium i rtęci, z których oba są silnymi neurotoksynami.”

Biorąc pod uwagę te informacje czy jest dziwnym, iż po otrzymaniu szczepionki z tymi składnikami dzieci umierają?

GlaxoSmithKline może spróbować ukryć przez jakiś czas te fakty, ale nie można ich ukrywać wiecznie. Infanrix Hexa należy natychmiast usunąć z rynku.

Źródło oryginalne: vactruth.com

Źródło polskie: PrisonPlanet.pl