

36-letni lekarz zmarł po drugiej dawce preparatu na COVID

15 lutego 2021

Centers for Disease Control and Prevention (CDC – amerykański sanepid) bada śmierć 36-letniego lekarza dr. Bartona Williamsa z Tennessee, który zmarł 8 lutego ok. miesiąca po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki na COVID.



Według doniesień prasowych dr Barton Williams zmarł z powodu wieloukładowego zespołu zapalnego (MIS-A), stanu spowodowanego atakiem układu odpornościowego na organizm, powodując wieloukładową niewydolność narządów. MIS-A jest uważany za niezwykle rzadki.

Daily Memphian i inne źródła podały, że osoby zaangażowane w dochodzenie uważają, że Williams dostał MIS-A w odpowiedzi na bezobjawowy przypadek COVID-19, a nie szczepionkę (to zaprzeczanie jest korzystne dla propagandy „proszczepiennej” – przypis WM).

Dr Stephen Threlkeld, specjalista od chorób zakaźnych, który leczył Williamsa i współpracuje z CDC w celu zbadania śmierci, powiedział współpracownikowi ABC News Memphis, że Williams uzyskał negatywny wynik testu na obecność COVID w szpitalu i że Williams powiedział mu, że zgodnie z jego wiedzą: nie miał wirusa.

Jednak Threlkeld powiedział, że testy ujawniły „dwa typy przeciwciał w układzie [Williamsa] – jeden rodzaj przeciwciał, które jest wynikiem naturalnej infekcji COVID, a drugi typ przeciwciał ze szczepionki”.

Autorstwo: Children's Health Defense Team

Na podstawie: LocalMemphis.com [\[1\]](#) [\[2\]](#), CDC.gov [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Źródło oryginalne (pełna wersja): ChildrensHealthDefense.org

Źródło polskie (skrót): PrisonPlanet.pl