

Bądźmy choć raz mądrzy przed szkodą

16 czerwca 2021

Kampania szczepionkowa, ograniczona do perswazji, odwołuje się do poczucia odpowiedzialności przy braku informacji istotnej dla poddanego zabiegowi pacjenta. Korzystając wyłącznie z opisów zamieszczonych przez producentów kontrowersyjnych produktów medycznych w ich własnych wytycznych, pragniemy udostępnić dane pomijane, być może celowo ignorowane, ale niezmiernie ważne dla każdego, zwłaszcza rodziców troszczących się o zdrowie ufnych, choć nieświadomych zagrożenia dzieci.

Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu Pfizera w populacji dziecięcej i młodzieży do lat 16 nie została jeszcze ustalona. Brakuje również dyspozycji w dostosowaniu dawki dla osób powyżej 65 roku życia. Wiadomo, że istnieją przeciwwskazania stosowania go w przypadku nadwrażliwości na jeden ze składników. Substancjami pomocniczymi są: ((4-hydroxybutyl) azanediyl) bis (hexane-6, 1-diyl) bis (2-hexyldecanoate) (ALC-0315), 2[(polyethylene glycol)-2000] -N,N ditertradecylacetamide (ALC-0159), 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC), cholesterol, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, sucrose, woda iniekcyjna. Niniejszy produkt nie może być łączony z innymi.

Skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność produktu nie zostały oszacowane w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością, oraz osób przyjmujących immunosupresanty. Skuteczność może być niższa u osób z obniżonym poziomem odporności. Celem śledzenia drogi produktu medycznego niezbędne jest odnotowanie każdej dawki zgodnie z etykietą.

Z uwagi na trwające badania kliniczne nieznany jest okres w jakim preparat skutecznie chroni organizm przed chorobą. Nie

można określić potencjalnych skutków interakcji preparatu z innymi lekami, gdyż nie prowadzono badań pod tym kątem. Nie wiadomo też jak wpływa na ciążę, karmienie niemowląt i płodność, gdyż ograniczona wiedza w tym zakresie pozwala oprzeć się na wynikach badań przeprowadzonych na zwierzętach. Nie odnotowano zjawisk niekorzystnie wpływających na przebieg ciąży, rozwój płodu, oraz rozwój po urodzeniu. Brak danych o przenikaniu preparatu do mleka matki, gdyż nie prowadzono takich badań.

Preparat Pfizera, podobnie jak inne „szczepionki na COVID-19”, wciąż jest produktem eksperymentalnym, którego długofalowe, wieloletnie skutki uboczne nie są znane. Niektórzy lekarze ostrzegają, że NOP-y ujawnią się po 48 tygodniu od szczepienia, inni mówią o dwóch latach. Mimo to, nakłania się obywateli do przyjmowania preparatu i wzięcie udziału w masowym eksperymencie, bez przeczytania stosownego ostrzeżenia i podpisania zgody na udział w nim. Znane są przypadki, gdy firmy ubezpieczeniowe odmówiły wypłacenia odszkodowania po zgonie poszczepiennym, ponieważ polisa zawierała klauzulę o zakazie brania udziału ubezpieczonego w eksperymentach medycznych.

Rodzicu – nie pozwól eksperymentować Pfizerowi na zdrowiu twojego dziecka! Każdy eksperyment medyczny może zakończyć się nieprzewidzianą tragedią – w tym śmiercią. Eksperymentowanie na zdrowych dzieciach, których życiu COVID-19 praktycznie nie zagraża, jest niemoralne.

Tłumaczenie: Jola

Na podstawie: [StopNOP.com.pl](https://stopnop.com.pl)

Źródło: WolneMedia.net