

Blokery dojrzewania płciowego powodują obrzęk mózgu

30 lipca 2022

Pacjenci zgłaszali zaburzenia widzenia, bóle głowy i wymioty. Inne skutki wywołane przez GnRH obejmowały wzrost ciśnienia krwi, obrzęk mózgu i neuropatię.



Urzednicy amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) ostrzegają, że dzieci, które przyjmują blokery dojrzewania płciowego, mogą doświadczyć obrzęku mózgu i utraty wzroku, wśród innych niebezpiecznych reakcji na „leki”.

Wbrew twierdzeniom aktywistów transgenderyzmu, że blokery dojrzewania płciowego i terapia hormonalna są „w pełni odwracalne” i nie powodują niebezpiecznych skutków ubocznych, FDA ostrzega, że blokowalniki dojrzewania, znane jako hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH), wykazują związek z guzem rzekomym mózgu (pseudotumor cerebri). Guz rzekomy mózgu zawiera objawy podobne do guza mózgu i został zidentyfikowany u sześciu dziewcząt w wieku od 5 do 12 lat.

Według raportu pacjenci zgłaszali objawy, w tym zaburzenia widzenia, bóle głowy i wymioty. Inne skutki wywołane przez GnRH obejmowały wzrost ciśnienia krwi, obrzęk mózgu i neuropatię. Rzecznik FDA powiedział, że organizacja ustaliła, że należy dodać ostrzeżenie do wszystkich produktów agonistycznych GnRH zatwierdzonych dla dzieci.

Autorstwo: Michał Waligóra

Na podstawie: „Rebel News”

Źródło: [MediaNarodowe.com](https://www.medianarodowe.com)