

# Burzyki balearskie mogą wyginać w ciągu 61 lat

1 kwietnia 2016

Jeśli burzyki balearskie (*Puffinus mauretanicus*), najrzadsze europejskie ptaki morskie, będą nadal tonąć, zaplątawszy się w sieciach rybackich i żyłkach wędkarskich, wyginą w ciągu 61 lat.

Autorzy publikacji z „Journal of Applied Ecology” wyliczyli, że pozostało ok. 3 tys. rozmnażających się par. Choć głównym zagrożeniem dla gatunku jest zaplątanie w sprzęt do łowienia, biologzy wspominają też o drapieżnikach, m.in. kotach i innych małych ssakach. Dane demograficzne zbierano w latach 1985-2014 w jednej z największych kolonii na świecie.

„Przeżywalność dorosłych , a zwłaszcza młodych dorosłych osobników jest dużo niższa niż sądzono. Gatunek jest niestabilny i kroczy po ścieżce ku wyginięciu” – opowiada prof. Tim Guilford z Wydziału Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Szacunki pokazują, że w około połowie przypadków do zgonu dorosłych osobników dochodzi wskutek zaplątania w sieci i żyłki. Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii zaznaczają, że szczególnym zagrożeniem są włoki denne. Wg Guilforda, bardzo dużo mogłoby zmienić zarzucanie sieci nocą, gdy ptaki nie są aktywne.

Autorstwo: Anna Błońska

Na podstawie: BBC.com

Źródło: [KopalniaWiedzy.pl](http://KopalniaWiedzy.pl)