

CDC bada związek szczepionki Pfizera z udarami mózgu

27 stycznia 2023

Amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób podaje niepokojące wyniki badań dotyczące szczepionki na COVID-19. Dane sugerują, że u seniorów zaszczepionych biwalentną szczepionką Pfizera stwierdzono więcej przypadków udaru mózgu.



Dane dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 amerykańskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób sugerują, że u seniorów zaszczepionych biwalentną szczepionką Pfizera stwierdzono więcej przypadków udaru mózgu. Chodzi o dwuskładnikową szczepionkę koncernu Pfizer i niemieckiej firmy BioNTech wyprodukowanej w technologii mRNA. Miała ona chronić lepiej przed nowymi odmianami wirusa SARS-CoV-2. Była ona stosowana jako tzw. booster, czyli dawka przypominająca, podawana po pierwszym szczepieniu.

Ze wstępnych danych CDC wynika, że w grupie osób w wieku co najmniej 65 lat zaszczepionych dwuskładnikową szczepionką Pfizera w okresie 21 dni po jej podaniu stwierdzono więcej przypadków niedokrwienego udaru mózgu. Jak na razie stwierdzono jedynie, że zachorowań u ludzi starszych jest

więcej niż u w grupie osób w wieku 22-44 lat również zaszczepionych tym samym preparatem. U seniorów częściej występują udary mózgu, podobnie jak inne schorzenia, aniżeli u osób w średnim wieku i młodszych.

Pfizer wraz z firmą BioNTech zapewniają w opublikowanym oświadczeniu, że wiedzą o doniesieniach sugerujących potencjalne występowanie udarów mózgu po podaniu szczepionki dwuskładnikowej przeciwko COVID-19 wśród osób w wieku co najmniej 65 lat. Jak na razie, eksperci wykluczają powiązanie ze schorzeniami.

Z danych przedstawionych przez CDC wynika, że wśród 550 tys. osób w wieku co najmniej 65 lat, które zaszczepiono preparatem dwuskładnikowym Pfizera, udar mózgu w okresie trzech tygodni po jego podaniu stwierdzono u 130 osób. Warto jednak zaznaczyć, że nie dochodziło tutaj do przypadków zgonu. „FDA zwraca uwagę, że jeśli chodzi o podobną szczepionkę w technologii mRNA innej amerykańskiej firmy Moderna nie zauważono wzrostu przypadków udarów mózgu po zaszczepieniu. Wymaga to dalszych badań, jednak rekomendacje dotyczące tych szczepień nie zostają zmienione” – informuje amerykańska Agencja Żywności i Leków.

Autorstwo: Krystian Rusiniak

Na podstawie: RadioMaryja.pl

Źródło: [MediaNarodowe.com](https://www.medianarodowe.com)