

Dzieci są 50 razy bardziej narażone na śmierć po szczepionce na Covid-19

9 lipca 2021

Były dyrektor wykonawczy Pfizera, dr Michael Yeadon, powiedział w niedawnym wywiadzie dla „Real America’s Voice”, że dzieci są 50 razy bardziej narażone na śmierć z po podaniu im szczepionki na koronawirusa (COVID-19) niż z powodu samego wirusa. Jego oświadczenie pojawiło się po tym, jak Pfizer przetestował swoją szczepionkę mRNA na dzieciach w wieku poniżej 12 lat, w tym na 6-miesięcznych dzieciach.

Reuters poinformował w zeszłym miesiącu, że do badania zostanie włączonych do 4500 dzieci w wieku poniżej 12 lat w ponad 90 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Polsce i Hiszpanii.

W oparciu o bezpieczeństwo, tolerancję i odpowiedź immunologiczną wygenerowaną przez 144 dzieci w badaniu pierwszej fazy dwudawkowej szczepionki, firma Pfizer powiedziała, że □□przetestuje dawkę 10 mikrogramów u dzieci w wieku od 5 do 11 lat i 3 mikrogramy w grupie od 6 miesięcy do 5 lat. Szczepionka Pfizera na COVID-19 została dopuszczona do stosowania u dzieci w wieku 12 lat w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dzieci otrzymują taką samą dawkę jak dorośli: 30 mikrogramów.

Według danych Amerykańskiej Akademii Pediatrii od początku pandemii na dzień 1 lipca ponad 4,04 mln dzieci uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Dostępne dane wskazują, że hospitalizacja i zgony związane z COVID-19 były u dzieci rzadkie.

Dr Yeadon, były wiceprezes i główny naukowiec ds. alergii i układu oddechowego w firmie Pfizer, podkreślił, że szczepionki stosowane przeciwko COVID-19 nie zostały wystarczająco przetestowane i nie powinny otrzymać zezwolenia na zastosowanie w sytuacjach awaryjnych, gdy dostępne są bezpieczne i skuteczne leki na COVID-19.

Yeadon wyjaśnił, że technologia mRNA zastosowana w szczepionce Pfizera przeciwko COVID-19 w celu pobudzenia organizmu do tworzenia wirusowych białek kolcowych jest „podstawowym problemem”, o którym naukowcy i badacze wiedzieli od lat. Według Yeadona te białka kolczaste mogą prowadzić do zakrzepów krwi i innych problemów zdrowotnych. Może to pomóc w wyjaśnieniu dużej liczby negatywnych odczynów poszczepiennych zgłaszanych do systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek (VAERS).

Yeadon powiedział, że w pierwszej połowie 2021 r. zgłoszono około 5000 zgonów związanych ze szczepionką na COVID-19. „Zwykle jest tylko około 200 rocznie odnosząc się do wszystkich szczepionek łącznie” – powiedział.

Na podstawie: NaturalHealth365.com [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#), [Reuters.com](#), [CitizensOfTheAmericanRepublic.org](#),

Źródło oryginalne: Naturalnews.com

Źródło polskie: [PrisonPlanet.pl](#)