

FDA zatwierdziła szczepionkę na małąpiałą ospę

20 września 2024

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA dopuściła do sprzedaży nową szczepionkę ACAM2000 na małąpiałą ospę, która będzie zakupiona przez rząd budujący zapasy na wypadek epidemii. Problem jest jednak taki, że osoby zaszczepione tą szczepionką na małąpiałą ospę będą do sześciu tygodni rozprzestrzeniać tego wirusa z własnego ciała na innych, powodując epidemie najróżniejszych schorzeń, włącznie ze śmiercią.

Poinformowano, iż skutki uboczne szczepionki obejmą: zapalenie mięśnia sercowego i (lub) zapalenie osierdzia, chorobę niedokrwinną serca i nieniedokrwinną kardiomiopatię rozstrzeniową, zapalenie mózgu, zapalenie mózgu i rdzenia, encefalopatię, postępującą ospę krowią (martwicę ospy krowiej), uogólnioną ospę krowią, ciężkie zakażenia skóry wywołane ospą krowią, rumień wielopostaciowy duży (w tym zespół Stevensa-Johnsona), wyprysk ospy krowiej, ospę krowią w oczach, która może prowadzić do ślepoty, ospę krowią płodu i śmierć płodu.

U osób zaszczepionych na małąpiałą ospę występują też ryzyka poważnej niepełnosprawności lub śmierci z powodu: chorób serca, chorób oczu leczonych miejscowymi sterydami, wrodzonych lub nabytych zaburzeń odporności, egzemy i innych chorób.

Szczepionka ACAM2000 zawiera żywe wirusy ospy, które mogą zostać przeniesione na osoby mające bliski kontakt z osobą zaszczepioną, a ryzyko związane z kontaktem z nią jest takie samo, jak to podane dla osób zaszczepionych.

Dalej podano, iż osoba zaszczepiona może doprowadzić nie tylko do wywołania wszystkich powyższych schorzeń u innych, ale również doprowadzić do śmierci osób niezaszczepionych! W

sekcji 6 dokumentu napisano: „Śmierć osób niezaszczepionych, które miały kontakt z osobami zaszczepionymi. [Zobacz Ostrzeżenia i środki ostrożności (5.1)]”.

Zaszczepieni powinni być izolowani przez co najmniej sześć tygodni, aby nie rozprzestrzeniaли ospy. Jednak żadna procedura nie obejmuje takiej kwarantanny i ci ludzie od razu po przyjęciu preparatu wyjdą na ulice miast.

W instrukcji na str. 23-24 czytamy: „Osoby zaszczepione lub ich opiekunowie muszą zostać poinformowani o konieczności unikania kontaktu z osobami narażonymi na wysokie ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych wirusa ospy, na przykład z osobami z przebytą lub obecną egzemą, niedoborami odporności, w tym zakażeniem wirusem HIV, w ciąży lub z dziećmi poniżej 12. miesiąca życia”. I dalej: „Samoszczepienie i rozprzestrzenianie się przez bliski kontakt. Osoby zaszczepione lub opiekunowie muszą zostać poinformowani, że wirus jest wydalany ze zmiany skórnej w miejscu szczepienia od około 2. dnia po szczepieniu do momentu oddzielenia się strupa i ponownego pokrycia nabłonka, zwykle 3 do 6 tygodni po pierwszym szczepieniu. Wirus ospy może być przenoszony przez bezpośredni kontakt fizyczny. Przypadkowe zakażenie skóry w miejscach innych niż miejsce celowego szczepienia (samoszczepienie) może wystąpić w wyniku urazu lub drapania. Rozprzestrzenianie się przez kontakt może również skutkować przypadkowym zaszczepieniem domowników lub innych bliskich kontaktów (w tym kontaktów seksualnych)”.

Jak widzimy, to nie jest szczepionka, ale broń biologiczna rozprzestrzeniająca przez zaszczepionych choroby i śmierć, która doprowadzi do nowych epidemii.

Na podstawie: [FDA.gov](https://www.fda.gov)

Źródło: [PrisonPlanet.pl](https://prisonplanet.pl)