

Indianie poniżej średniej krajowej

22 listopada 2011

Z opublikowanego raportu Forum Amazon, stawiającego sobie za cel nakreślenie milenijnych celów rozwoju w Amazonii, wyłania się niepokojąca sytuacja społeczna rdzennych mieszkańców, którzy w wielu elementach, w tym sytuacji społecznej i zdrowotnej, klasyfikują się poniżej średniej krajowej.

Badania objęły swoim zasięgiem dziewięć państw i regionów: Brazylię, Boliwię, Kolumbię, Ekwador, Peru, Wenezuelę, Surinam, Ekwador, Gujanę i Gujanę Francuską. Według zgromadzonych danych w granicach dziewięciu krajów mieszka ponad 1,6 mln amazońskich Indian. Nie wszyscy mieszkają jednak na prawnie uznawanych terytoriach, co według raportu, istotnie wpływa na utrzymanie i poprawę jakości życia poszczególnych społeczności. „Walka z ubóstwem i głodem jest ściśle związana z gwarancją do korzystania z tradycyjnych terytoriów. Konsolidacja na tym tle pozwala rdzennym mieszkańcom na pozyskanie żywności poprzez rybołówstwo, myślistwo i rolnictwo” – podkreślają autorzy badań.

Najbardziej niepokojące wskaźniki dotyczące ludności tubylczej związane są z brakiem podstawowych usług i znacznych odległości geograficznych, które utrudniają dostęp do opieki zdrowotnej. Szczególnie bijąca na alarm jest wysoka zapadalność na choroby takie jak malaria, gruźlica i choroby przenoszone drogą płciową. Częstotliwość występowania gruźlicy u brazylijskich Indian cechuje się na poziomie 101 na 100 tysięcy osób, podczas gdy średnia krajowa w Brazylii to 37,9. W Wenezueli wskaźnik zapadalności na gruźlicę u tamtejszych Indian to aż 450 na 100 tys. osób.

Raport zwraca szczególną uwagę na wirus HIV/AIDS, którego przedostanie się na łono lokalnych społeczności niesie ryzyko

wyniszczenia tych populacji, ponieważ poligamia jest częścią wielu kultur, natomiast informacje i metody zapobiegania zachorowalności na tę infekcję pozostają słabo rozpowszechnione.

Śmiertelność niemowląt u Indian wciąż pozostaje na poziomie krytycznym. Według badań, w Brazylii w roku 2007, na tysiąc urodzeń przypadło 50 zgonów, co daje dwukrotnie większą śmiertelność niż średnia krajowa. Jeszcze większy rozdzźwięk na tym tle występuje u wenezuelskich Indian, u których śmiertelność niemowląt jest dziesięciokrotnie większa niż średnia krajowa. Głównymi przyczynami przedwczesnych śmierci indiańskich dzieci pozostają niedożywienie, zapalenie płuc i odwodnienie.

W badaniu zwrócono uwagę na niewielką liczbę szkół, mimo istnienia przepisów krajowych, gwarantujących rdzennym mieszkańcom edukację zgodną z ich wyznacznikami kulturowymi.

Raport o milenijnych celach rozwoju wskazuje także na środowiskowe zagrożenia dla lokalnych społeczności. Chociaż Amazonia należy do najlepiej zachowanych obszarów, we wszystkich dziewięciu wymienionych krajach, rdzenne terytoria znajdują się pod ciągłą presją z powodu eksploatacji surowców naturalnych, zwłaszcza wyrębu lasów i górnictwa. Według cytowanego w badaniu Instytutu Socioambiental, 99 rdzennych ziem znajduje się w stanie ciągłego, zewnętrznego zagrożenia.

Opracowanie: Damian Żuchowski

Na podstawie: amazonia.org.br, agenciabrasil.gov.br

Dla „Wolnych Mediów”