

Lek antynikotynowy groźny dla serca?

7 lipca 2011

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nakazała ostrzeganie lekarzy i pacjentów, że stosowanie leku ułatwiającego rzucenie palenia – o nazwie Champix – może zwiększać ryzyko ataków serca i innych problemów z krążeniem.

Lek został wprowadzony na rynek w 2006 roku i – jak podaje „Daily Mail” – w Wielkiej Brytanii był przepisywany pacjentom w zeszłym roku nieomal milion razy.

– Ludzie, którzy rzucają palenie, oczekują pewnego rodzaju benefitów dla zdrowia. Nikt nie bierze pod uwagę, że rzucając palenie może mieć nagle więcej problemów z sercem – przyznaje Yoon Loke, badacz z University of East Anglia.

Jednak zgodnie z rezultatami opublikowanych analiz, podczas których Amerykańscy i Brytyjscy naukowcy prześwietlili wyniki 14 oddzielnych badań, dotyczących 8000 palaczy, stosowanie tabletek Chantix zwiększa o 72 proc. prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z sercem. Zdaniem dr Loke lek może także powodować koszmary i bezsenność.

Badanie opublikowane w Canadian Medical Association Journal ujawnia, że w grupie badanych osób, biorących lek, 52 osoby (spośród 4908) miały problemy z sercem, natomiast wśród osób zażywających tabletki placebo nieprawidłowości w pracy serca wystąpiły u 27 osób (spośród 3308). Pfizer – firma produkująca Champix, radzi zachować umiar w wyciąganiu wniosków i wskazuje, że liczba problemów z sercem wśród osób biorących lek, jest wciąż bardzo mała. Co więcej, procent zgonów w obu grupach był identyczny.

Chantix to lek w formie tabletek, zażywany dwa razy dziennie, działający na receptory w mózgu i redukujący niepożądane

skutki odstawienia nikotyny. Jak podaje „USA Today”, sprzedaż tego popularnego w Stanach Zjednoczonych leku zaczęła spadać w 2008 roku, gdy zaczął być łączony z występowaniem efektów ubocznych, takich jak depresja i myśli samobójcze.

Opracowanie: Grzegorz Frąc

Źródło: [eLondyn](#)