

Lek na grypę powoduje „dziwne zachowanie” pacjentów

1 grudnia 2017

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Dobrobytu Japonii w najbliższym czasie opublikuje wskazówki dla szpitali i przychodni w związku z ryzykiem „dziwnego zachowania” pacjentów, przyjmujących lekarstwa przeciwko grypie, poinformowała agencja Kiodo.

Ministerstwo zauważa, że w zeszłym roku doszło do 54 przypadków, kiedy chorzy na grypę ludzie, głównie dzieci i młodzież, zaczęli biegać lub próbowali wyskoczyć z okna.

Wcześniej o podobnym zagrożeniu mówiono w związku z lekarstwem Tamiflu, znanym również jako oseltamivir. W Japonii już od kilku lat nie przepisuje się go młodzieży. Teraz Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że ryzyko dotyczy również tych, którzy przyjmują Laninamivir i Relenzę (Zanamivir).

Łącznie w zeszłym roku lekarze wykryli 38 przypadków nienormalnego zachowania spowodowanego przyjęciem Tamiflu, 11 – Relenzy i 5 Laninamiviru. Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Dobrobytu zaleca podczas przyjmowania tych preparatów pilnowanie, aby okna i drzwi były zamknięte, a w piętrowych domach prywatnych umieszczanie chorego na grypę członka rodziny na parterze.

Źródło: pl.SputnikNews.com