

Niebezpieczna epidemia „mięsożernej bakterii” w Japonii

28 czerwca 2024

Japonia zmaga się z niebezpieczną epidemią wywoływaną przez rzadką, ale śmiertelną bakterię, która może zabić człowieka w ciągu zaledwie 48 godzin. Eksperci alarmują, że liczba przypadków tej groźnej choroby rośnie w zastraszającym tempie, a sytuacja może wymknąć się spod kontroli.

Paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego (TSS) to choroba wywoływana przez szczepy *Streptococcus* grupy A (GAS), które mogą prowadzić do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i śmierci pacjenta. Według danych Japońskiego Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych, do 2 czerwca 2023 roku odnotowano już 977 przypadków tej choroby – znacznie więcej niż rekordowa liczba 941 przypadków zarejestrowanych w całym 2022 roku.

Profesor Ken Kikuchi z Uniwersytetu Medycznego Kobiet w Tokio ostrzega, że przy utrzymującym się tempie infekcji, w tym roku liczba przypadków TSS w Japonii może sięgnąć nawet 2500, a wskaźnik śmiertelności może wynieść aż 30 procent. „Większość zgonów następuje w ciągu 48 godzin” – podkreśla ekspert. Dodaje, że w przypadku tej choroby objawy rozwijają się błyskawicznie – rano pacjent może zauważyć obrzęk stopy, a do południa infekcja może rozprzestrzenić się aż na kolano, prowadząc do śmierci chorego.

Streptococcus grupy A to bakteria, która zazwyczaj powoduje u dzieci łagodne objawy, takie jak ból i obrzęk gardła. Jednak niektóre szczepy GAS mogą wywoływać znacznie groźniejsze powikłania, w tym wstrząs toksyczny, niewydolność narządów i śmierć. Szczególnie narażone na tę chorobę są osoby po 50. roku życia.

Ekspertsi podkreślają, że kluczowe znaczenie ma szybkie rozpoznanie objawów i natychmiastowe leczenie. Niestety, w przypadku „mięsożernej bakterii” objawy rozwijają się błyskawicznie, a pacjenci często umierają w ciągu 48 godzin od pierwszych symptomów. Dlatego tak ważne jest, aby społeczeństwo było świadome zagrożenia i przestrzegało podstawowych zasad higieny.

Profesor Kikuchi zaleca, aby ludzie dokładnie myć ręce, a także natychmiast leczyć wszelkie otwarte rany. Ostrzega również, że pacjenci mogą przenosić bakterię GAS w jelitach, a „mięsożerne bakterie” mogą zainfekować dłonie poprzez kontakt z kałem.

Sytuacja epidemiologiczna w Japonii budzi poważny niepokój, ale problem ten dotyczy również innych krajów. Pod koniec 2022 roku co najmniej pięć państw europejskich zgłosiło Światowej Organizacji Zdrowia wzrost liczby przypadków inwazyjnych paciorkowców grupy A, do których zalicza się TSS.

Ekspertsi apelują, aby władze i społeczeństwo potraktowały tę sytuację z najwyższą powagą. Konieczne są zdecydowane działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej choroby, a także edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki i wczesnego reagowania na objawy. W przeciwnym razie epidemia „mięsożernej bakterii” może przerodzić się w globalną tragedię zdrowia publicznego.

Źródło: [ZmianyNaZiemi.pl](https://zmiany.naziemi.pl)