

Niewielkie ryzyko ponownego ciężkiego przejścia COVID-19

4 grudnia 2021

Wyniki opublikowanego w zeszłym tygodniu badania wykazały, że w przypadku osób, które wyzdrowiały po zainfekowaniu wirusem COVID-19, istnieje niewielkie ryzyko ponownego zachorowania na tę chorobę.

Naukowcy z Kataru zbadali grupę ponad 353 000 osób, korzystając z krajowych baz danych zawierających informacje o pacjentach, u których za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy potwierdzono infekcję COVID-19. Badana populacja zachorowała na COVID-19, chorobę wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, między 28 lutego 2020 roku a 28 kwietnia 2021 roku. Ponowne zarażenie się wirusem było odnotowywane, jeśli osoba wykazała wynik pozytywny co najmniej 90 dni po pierwszym zakażeniu.

Po wykluczeniu ok. 87 500 osób ze świadectwem szczepienia, badacze odkryli, że osoby z odpornością wynikającą z ozdrowienia po przebytych COVID-19 odznaczały się niewielkim ryzykiem ponownego zakażenia się nim lub ciężkiego przebiegu choroby. Zidentyfikowano zaledwie 1304 reinfekcje. Oznacza to, że 0,4 proc. osób z naturalną odpornością i nieposiadających świadectwa szczepienia zachorowało na COVID-19 po raz drugi.

Jak wynika z badania, prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby wyniosło 0,1 z pierwotnej liczby zakażeń. Wykryto tylko cztery takie przypadki. Nie odnotowano przypadków śmiertelnych wśród osób, które zaraziły się po raz drugi.

Badanie zostało opublikowane w „New England Journal of Medicine”. A sfinansowali go: Weill Cornell Medicine-Qatar, katarskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Hamad Medical Corp. i Sidra Medicine.

Uprzednio badacze, Laith Abu-Raddad z Weill Cornell Medicine-

Qatar i dr Robert Bertolini z katarskiego Ministerstwa Zdrowia Publicznego, oceniali skuteczność naturalnej odporności przed ponowną infekcją na 85 proc. lub większą. „W związku z tym, dla osoby, która już miała pierwotną infekcję, ryzyko wystąpienia ciężkiej reinfekcji wynosi zaledwie ok. 1 proc. ryzyka wystąpienia ciężkiej pierwotnej infekcji u osoby wcześniej niezakażonej” – stwierdzili badacze.

„Należy ustalić, czy taka ochrona przed ciężkim zachorowaniem po ponownym zainfekowaniu utrzymuje się przez dłuższy czas, analogicznie do odporności, jaka rozwija się przeciwko innym, sezonowym »przeziębieniom« koronawirusami, które wywołują krótkoterminową odporność przeciwko łagodnej reinfekcji, ale długoterminową odporność przeciwko cięższej chorobie przy ponownej infekcji. Gdyby tak było w przypadku SARS-CoV-2, wirus ten może przyjąć bardziej łagodny wzór infekcji (a przynajmniej jego dotychczas przebadane warianty), gdy stanie się endemiczny”.

„Ważne, że badanie pokazuje, jak rzadka jest reinfekcja i ciężki przebieg choroby po wyleczonym COVID-19” – napisała na „Twitterze” dr Monica Gandhi, lekarz chorób zakaźnych z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

Powiedziała, że badanie to dołącza do rosnącej liczby badań, które wskazują, iż ludzie, którzy wyleczyli się z COVID-19 cieszą się wysokim poziomem odporności na ponowne zakażenie i jeszcze większą ochroną przed ciężkim zachorowaniem i śmiercią.

Autorstwo: Zachary Stieber

Źródło oryginalne: [TheEpochTimes.com](https://www.theepochtimes.com)

Źródło polskie: [EpochTimes.pl](https://epochtimes.pl)