

Ostrzeżenie dla mężczyzn w wieku 18-40 lat

11 października 2022

Kierując się badaniami przyczyn drastycznie zwiększonej ilości przypadków zgonów (84%) na tle problemów kardiologicznych, stanowy Wydział Zdrowia Florydy w USA opublikował wnioski.

Czytamy w nich, że wśród mężczyzn w przedziale wiekowym 18-39 lat, którzy poddali się szczepionkom mRNA, zaobserwowano podwyższony wskaźnik śmiertelności w okresie 28 dni od przyjęcia preparatu. Biorąc pod uwagę ogólną odporność organizmu ludzkiego na działanie wirusa COVID-19, korzyść z przyjęcia preparatu w zestawieniu ze skutkami do jakich należą powikłania kardiologiczne prowadzące do zgonu jest niewspółmierna.

W związku z tym, lekarz stanowy Florydy dr Joseph Ladapo zalecił, by mężczyźni w tej grupie wiekowej wzięli pod uwagę ryzyko przed podjęciem decyzji o szczepieniu. Lekarz zaznaczył, że nie zanotowano, by preparaty nieoparte na strukturze mRNA wywoływały analogiczne skutki.

Osobom ze stwierdzonymi wcześniej schorzeniami kardiologicznymi – zapalenie mięśnia sercowego, lub zapalenie osierdzia, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Doktor Ladapo podkreślił, że do niezmiernie ważnych zadań służby zdrowia należy ocena korzyści i ryzyka związanego ze skutecznością szczepionek.

Dotychczas zbyt mało wagi przywiązywano temu istotnemu czynnikowi, tak jak i lekceważono obawy wielu osób. Biorąc pod uwagę istotę badań, postanowiono udostępnić mieszkańcom Florydy te informacje, zatem badania i wnioski zostały opublikowane na oficjalnej stronie internetowej stanu Floryda.

Opracowanie: Jola

Na podstawie: [FloridaHealth.gov](https://www.floridahealth.gov)

Źródło: WolneMedia.net