

Po szczepionce możesz nie odzyskać pełnej odporności

26 października 2021

Jeśli przyjąłeś którykolwiek z preparatów zwanych „szczepionką przeciwko Covid-19”, NIGDY już nie będziesz mógł ponownie uzyskać pełnej odporności – przyznaje wprost najnowszy brytyjski raport rządowy.

W raporcie numer 42 pt. [„COVID-19 vaccine surveillance report”](#) wydawanym cotygodniowo przez brytyjską rządową agencję U.K. Health Security Agency, na stronie 23 czytamy, że „poziom przeciwciał N [Roche N seropositivity] wydaje się być niższy u osób, które przyjąwszy dwie dawki szczepienia, zarażają się”.

W raporcie przesyconym pseudomedyczną propagandą o „skuteczności” preparatów szczepionkowych i manipulacyjnymi statystykami, nie uniknięto przyznania się do najgorszego, bowiem raport przyznaje, że ten spadek odporności może być trwały.

Na tę informację ukrytą w raporcie zwrócił uwagę znany dziennikarz Alex Berenson, okrzyczany od początku tzw. pandemii jako „rozpowszechniający fałszywe informacje o COVID-19”, a później „fałszywe informacje o szczepionkach”. Co interesujące, Berenson sam zaszczepił się na początku programu wyszczepiania, lecz teraz walczy nie tylko o tzw. wolność wyboru i z cenzurę (w tym w pismach naukowych), lecz wskazuje na manipulacje agencji rządowych oraz na szkodliwość tzw. szczepionek przeciwko COVID-19.

Czytając raport rządowy Berenson zadaje zasadnicze pytanie i odpowiada: „Co to znaczy? Kilka rzeczy i wszystkie złe”. „Wiemy, że szczepionki nie powstrzymują infekcji ani przenoszenia wirusa (w rzeczywistości raport pokazuje w innym miejscu, że zaszczepione osoby dorosłe są obecnie zakażone w znacznie WYŻSZYCH wskaźnikach niż osoby nieszczepione)”.

„Brytyjczycy przyznają, że odkrywają teraz, iż szczepionka zaburza wrodzoną zdolność organizmu po infekcji do wytwarzania przeciwciał przeciwko nie tylko kolca białka, ale także innym fragmentom wirusa. W szczególności, zaszczepione osoby nie wydają się wytwarzać przeciwciał przeciwko białku nukleokapsydu, otoczce wirusa, które są kluczową częścią odpowiedzi u osób nieszczepionych”.

W dłuższej perspektywie ludzie, którzy przyjmą „szczepionki”, będą znacznie bardziej podatni na wszelkie mutacje w białku kolców, które mogą się pojawić, nawet jeśli już raz zostali zainfekowani i wyzdrowieli.

W międzyczasie niezaszczepieni uzyskają długotrwałą, jeśli nie trwałą, odporność na wszystkie szczepy domniemanego wirusa po naturalnym zakażeniu nim, choćby jeden raz.

„Oznacza to również, że wirus prawdopodobnie wybierze mutacje, które idą dokładnie w tym kierunku, ponieważ zasadniczo dadzą mu ogromną podatną populację na zarażenie” – ostrzega dalej Berenson. „I prawdopodobnie jest jeszcze więcej dowodów na to, że szczepionki mogą zakłócać rozwój silnej, długoterminowej odporności po infekcji.”

Na podstawie: [NaturalNews.com](https://www.naturalnews.com/058111_coronavirus_vaccine_side_effects.html),
[Assets.publishing.service.gov.uk](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/612341/20200528-coronavirus-vaccine-qa.pdf)
Opracowanie i źródło: [Bibula.com](https://bibula.com)