

Radioaktywne skażenie żywności w Japonii

11 kwietnia 2013

Pojawiają się kolejne niepokojące informacje na temat efektów skażenia radioaktywnego w wyniku zniszczenia elektrowni jądrowej w Fukushima. Japońskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o radioaktywności wykrytej w okolicy zakładu i nie są to dane optymistyczne.

Według doniesień z kraju kwitnącej wiśni w promieniu 360 kilometrów wykrywane jest skażenie izotopami cezu Cs-137 oraz Cs-134. Przekroczenia parametrów dopuszczalnego prawem promieniowania odkryto w japońskiej żywności. Dla mieszkańców oznacza to, że roczne dawki promieniowania otrzymają w kilka miesięcy lub tygodni. Wymieniono szczególnie jeden produkt, krakersy ryżowe, które są dość popularnym pożywieniem dla zwykłych Japończyków.

O skali problemu wskazuje też fakt, że podwyższone poziomy promieniowania wykryto w prefekturze Shizuoka, która znajduje się jeszcze dalej od Fukushimy niż Tokio. Wniosek może być jeden: niebezpieczne skażenie radioaktywne dotyczy nie tylko strefy wokół zakładu, co nam wmawiano, ale ma dużo większy zasięg oddziaływania.

Na podstawie: fukushima-diary.com

Źródło: [Zmiany na Ziemi](#)