

Spadek aktywności słonecznej wywoła zlodowacenie

3 maja 2013

Oprócz jedenastoletniego cyklu aktywności słonecznej, który trudno obecnie nazwać regularnym, Słońce podlega innym większym cyklom. Na przestrzeni kilkuset lat obserwacji gwiazdy trudno jest je wszystkie poznać, ale rosyjscy naukowcy twierdzą, że mamy aż nadto poszlak, które wskazują na to, że nadchodzi trwający około 200 lat okres znacznego uspokojenia naszej gwiazdy.

Ostatni raz zjawisko to zaobserwowano między 1650 i 1850 rokiem. Obecnie ten okres globalnego ochłodzenia jest nazywany „małą epoką lodowcową. Naukowcy z Obserwatorium Pułkowo w Sankt Petersburgu twierdzą, że nadchodzące ochłodzenie może się rozpocząć między 2030 i 2040. Ich zdaniem nie będzie to tak dotkliwe, jak ostatnim razem, gdy regularnie zamarzał Bałtyk umożliwiając podróże saniami z Rzeczypospolitej do Szwecji.

Według członka Rosyjskiej Akademii Nauk Władimira Kotlyakova, nie ma powodu, by sądzić, że globalne ocieplenie będzie trwało do końca tego wieku. Działalność człowieka i emisje przemysłowe mają z pewnością pewien wpływ na środowisko, ale znacznie mniej istotny niż inne siły natury. Skoro jednak oczekujemy poważnego ochłodzenia to może zamiast zażynać własny przemysł trzeba zadbać o zbawienny w takich okolicznościach efekt cieplarniany?

Źródło: [Zmiany na Ziemi](#)