

# Szczepienia najczęściej wywołujące autyzm i encefalopatię

7 marca 2015

Szczepienia najczęściej wywołujące autyzm i encefalopatię: dane amerykańskie z bazy VAERS. To tylko ok. 5% wszystkich prawdopodobnych powikłań.

Z tabeli widać, że najgroźniejsza jest szczepionka MMR, zawierająca żywe wirusy, choć wszystkie podawane niemowlętom szczepienia mogą wywoływać zapalenie mózgu, autyzm i encefalopatię. Mamy tu niewątpliwie do czynienia z synergizmem wielu szczepiennych toksyn. Wcześniej podane szczepionki ciężko zatrują organizmy niemowląt – ich układ nerwowy i odpornościowy – a kiedy ok. 1 roku podaje się im żywe wirusy w szczepionce MMR – wtedy następuje całkowite załamanie i wybuch objawów chorobowych.

Ciekawe, że wśród Amiszów, których dzieci są nieszczepione, praktycznie nie spotyka się autyzmu, ADHD i większości innych zaburzeń rozwojowych, i umieralność niemowląt jest tam znacznie mniejsza niż średnia w USA. Ani nie słyszy się o epidemiach polio czy innych chorób zakaźnych w tej populacji. Część dzieci przechoruje na dziecięce choroby zakaźne, co uważa się za normalne i daje im odporność na całe życie. Duże populacje ludzi takich jak Amisze, którzy nie poddają się medycznemu terrorowi, pokazują, że masowe szczepienia w naszych czasach są zbędne i groźne, zarówno dla jednostek jak i całego społeczeństwa.

Autorstwo: prof. Maria Dorota Majewska

Źródło: [Wolna Polska](#)