

„Szczepionki” mRNA odpowiadają za wzrost nagłych zgonów

22 listopada 2024

Mocno ocenzurowane badanie potwierdziło, że „szczepionki” mRNA COVID-19 są odpowiedzialne za gwałtowny wzrost liczby nagłych zgonów i śmiertelnych chorób.



Badanie to zostało w końcu opublikowane w cenzurowanym czasopiśmie medycznym Lancet po licznych próbach jego usunięcia, które miały za cel uniemożliwić upublicznienie tych odkryć. Wyniki ujawniły, że dane z sekcji zwłok wskazują na to, że zastrzyki Covid mRNA w przeważającej mierze przyczyniły się do zgonów na całym świecie.

To badanie wykazało, że zastrzyki Covid są „bezpośrednio” powiązane z oszałamiającą liczbą 73,9% wszystkich zgonów.

Zespół badawczy stojący za tymi badaniami składał się z czołowych amerykańskich onkologów, kardiologów, lekarzy i naukowców, w tym: Nicolas Hulscher, Paul E. Alexander, Richard Amerling, Heather Gessling, Roger Hodgkinson, William Makis,

Harvey A. Risch, Mark Trozzi i Peter A. McCullough.

Badanie wykazało, że 73,9% wszystkich zgonów było „bezpośrednio spowodowanych lub znacząco przyczyniły się” zastrzyki mRNA na COVID-19. Dane z sekcji zwłok ujawniają bezpośredni związek „między szczepieniem COVID-19 a śmiercią”, zauważają naukowcy w swoim artykule.

Po dwukrotnym ocenzurowaniu i zablokowaniu do publicznego wglądu, recenzowane badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Science, Public Health Policy and the Law”. Badanie zostało wcześniej ocenzurowane po tym, jak zostało opublikowane w czasopismach takich jak „The Lancet” i „Forensic Science International”, należących do Elsevier. Najnowsze wydanie badania prowadzonego przez dr McCullough identyfikuje 678 testów. Przy średnim wieku zgonu wynoszącym 70,4 lat, układ sercowo-naczyniowy był najbardziej zaangażowanym układem narządów wśród przypadków.

Na kolejnych miejscach znalazły się układy krwiotwórczy (17%), oddechowy (11%) i wielonarządowy (7%). W 21 przypadkach „szczepionki” na COVID-19 miały wpływ na trzy lub więcej układów narządów. Średni czas od szczepienia do zgonu wynosił 14,3 dnia, co sugeruje związek czasowy. Większość zgonów nastąpiła w ciągu tygodnia od ostatniego podania szczepionki.

W badaniu potwierdzono, że łącznie 240 zgonów (73,9%) zostało niezależnie uznanych za „bezpośrednio spowodowane szczepieniem przeciwko COVID-19 lub znacząco się do niego przyczyniło”. Spośród tych zgonów spowodowanych szczepionką, główne przyczyny śmierci obejmowały: nagłą śmierć sercową (35%), zatorowość płucną (12,5%), zawał mięśnia sercowego (12%), VITT (7,9%), zapalenie mięśnia sercowego (7,1%), wieloukładowy zespół zapalny (4,6%) i krwotok mózgowy (3,8%).

Badanie to zostało w końcu opublikowane pośród niedawnej fali dowodów związanych ze szczepionkami na COVID-19.

W zeszłym tygodniu dr McCullough, jeden z najbardziej

szanowanych ekspertów medycznych na świecie, wydał ostrzeżenie dla opinii publicznej, że „szczepionki” mRNA na COVID-19 zostały stworzone zgodnie z „surowymi kryteriami wojskowymi”, aby służyć jako „broń biologiczna”. Ten czołowy lekarz był liderem w ujawnianiu szkodliwości zastrzyków tych preparatów. McCullough podniósł alarm, ujawniając niszczycielski wpływ na ludzkość spowodowany masową globalną kampanią szczepień.

„Jako lekarz nigdy nie widziałem czegoś tak szkodliwego dla ludzkiego ciała” – powiedział McCullough. Kontynuował, cytując wiele badań, wraz z własnymi odkryciami, które dowodzą, że zastrzyki spowodowały bezprecedensowy poziom śmierci i obrażeń. Jak wyjaśnia, mRNA z zastrzyków „atakuje mózg”. „Atakuje serce” – kontynuuje. „Powoduje uszkodzenie mózgu i serca. Atakuje szpik kostny. Stymuluje przeciwciała do atakowania komórek i płytek krwi. Powoduje krzepnięcie krwi i uszkodzenia naczyń krwionośnych, jakich nigdy nie widzieliśmy”.

Zauważył również, że dane z Uniwersytetu w Pittsburghu pokazują, że „szczepionki” powodują raka. „Od kiedy mamy białko, które faktycznie uszkadza mózg, serce, szpik kostny, układ odpornościowy, powoduje krzepnięcie krwi i potencjalnie powoduje raka w jednym białku?” zapytał McCullough. „To broń” – podsumował. „Zgodnie ze ścisłymi kryteriami wojskowymi jest to broń biologiczna”.

Tymczasem grupa wiodących kardiologów w Nowej Zelandii właśnie ujawniła, że „szczepionki” mRNA na COVID-19 są wzbogacone śmiertelną „kardiotoksyną”, która została zidentyfikowana jako jedyna przyczyna rosnącej niewydolności serca i nagłych zgonów z powodu zatrzymania krążenia na całym świecie, jak wcześniej informował „Slay News”. Tą wybuchową informację ogłoszono podczas konferencji kardiologicznej w Auckland, Nowa Zelandia. Najbardziej szanowani w kraju specjaliści od serca odkryli, że białko spike generowane przez zastrzyki Covid mRNA jest odpowiedzialne za bezprecedensowe skoki niewydolności serca, nagłe zgony i inne śmiertelne choroby. W rezultacie

nowozelandzcy kardiologowie uznają obecnie „szczepionki” mRNA na COVID-19 za „kardiotoksynę” – substancję, która powoduje bezpośrednie uszkodzenie serca. Kardiologowie przyznali, że to toksyczne białko jest główną przyczyną alarmującego wzrostu licznych chorób i zgonów związanych z sercem.

Od czasu wprowadzenia zastrzyków mRNA na początku 2021 r., niewydolność serca gwałtownie wzrosła zarówno u młodych, jak i starszych pacjentów. Wielu pracowników służby zdrowia zaczyna teraz mówić o narastającym kryzysie służby zdrowia publicznego, który rząd i władze zdrowotne wydają się w sposób zdeterminowany ignorować.

Korekta tłumaczenia automatycznego Deepl.com: Foxi

Źródło zagraniczne: LionessOfJudah.substack.com

Źródło polskie: WolneMedia.net