

Thimerosal ma związek z zaburzeniami nerologicznymi

10 kwietnia 2016

Rządowy raport opublikowany w 2003 r. przyznaje istnienie bezpośredniego związku pomiędzy szczepionkami zawierającymi thimerosal a zaistnieniem neurorozwojowych zaburzeń u dzieci.

Jeden z protestów przeciwko przymusowym szczepieniom w USA. Napis głosi: „Przymusowe szczepienie to gwałcenie dzieci”.

Dla tych, którzy nie mają pojęcia o thimerosalu wyjaśniamy, że jest to organiczny związek rtęci, który ma właściwości antyseptyczne i przeciwgrzybicze. Używa się go w charakterze sztucznego konserwantu w szczepionkach, preparatach immunoglobulinowych, testach skórnych na antygeny, surowicach, produktach oftalmicznych, preparatach nosowych oraz w tuszach do tatuażu.

Oto studium problemu opublikowane na witrynie Pubmed.gov: „Z początku byliśmy bardzo sceptyczni co do tego, że różnice w stężeniach thimerosalu w szczepionkach miałyby jakikolwiek wpływ na poziom zapadalności na neurorozwojowe zaburzenia po dokonaniu dziecięcych szczepień ochronnych. To studium przedstawia pierwszy epidemiologiczny dowód, oparty na dziesiątkach milionów dawek szczepionki zaaplikowanych w USA, jaki demonstruje proces przyczynowo-skutkowy między wzrostem ilości thimerosalu w szczepionkach a zaburzeniami o charakterze neurorozwojowym”.

To studium dowiodło tego, o czym alternatywna społeczność medyczna mówiła i udowadniała od wielu lat, a co było wciąż pomijane zarówno przez media głównego nurtu, jak i korproacyjno-państwową medycynę, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy dziećmi z postępującym autyzmem, niedorozwojem umysłowym oraz zaburzeniami mowy, a szczepionkami zawierającymi thimerosal.

Dla tych, którzy zajmują się medycyną alternatywną, nie jest to żadną niespodzianką. Nie jest również zaskoczeniem fakt, że wybuchy epidemii choroby podczas ostatnich stu lat prawie zawsze mają miejsce po zastosowania szczepień, natomiast niemal nigdy nie występowały u społeczności, które nie były poddawane szczepieniom. A oto kilka przykładów:

- w latach 1871-1872, Anglia, 98% populacji w wieku od 2 do 50 lat zostało zaszczepione przeciwko ospie, skończyło się na tym, że wybuchła najgorsza epidemia ospy, jaka pochłonięła 45 000 ofiar. W tym samym czasie w Niemczech, wraz z zaszczepieniem 96% populacji, wskutek tej samej choroby zmarło 125 000 ludzi (Dokumenty Hadwena).

- w Niemczech, przymusowe masowe szczepienia przeciw dyfterytowi wykonane w latach 1940-1945, spowodowały wzrost poziomu zachorowań na tę chorobę z 40 000 do 250 000 przypadków („Don't Get Stuck”, Hannah Allen).

- w USA w 1960 r., dwóch wirusologów odkryło, że obie szczepionki na polio były zakażone wirusem SV 40, który powoduje raka u zwierząt tak samo, jak dokonuje zmian w ludzkiej komórce. Milionom dzieci zaaplikowano zastrzyki zawierające obydwie szczepionki („Medical Journal of Australia”, 17.03.1973, str.555).

- w 1967 r. Ghana ogłosiła, że kraj jest wolny od możliwości zarażenia się odrą. Ogłoszenie pochodziło od WHO po przeprowadzeniu szczepień w obrębie 96% populacji. W 1972 r., Ghanę nawiedziła najgorsza fala zachorowań na odrę, co dodatkowo spowodowało najwyższy stopień śmiertelności spośród odnotowanych tam epidemii (dr H. Albonico, „Kampania Szczepieniowa MMR w Szwajcarii”, marzec 1990).

Najnowsze informacje dowodzą tylko po raz kolejny istnienia bezpośredniego związku między szczepionkami i wybuchem epidemii dokładnie tej choroby, przeciwko której dokonuje się szczepień. mWspomina o tym najnowszy artykuł Mike'a Adamsa

wyjaśniający, że pojawienie się krztuśca jest częstsze u dzieci, które już zostały na niego zaszczepione.

Inne badanie opublikowało w 2007 r. czasopismo „Journal of Toxicology and Environmental Health” (autorytet w dziedzinie badań toksykologicznych). Geier i Geier w artykule „A Case Series of Children with Apparent Mercury Toxic Encephalopathies Manifesting with Clinical Symptoms of Regressive Autistic Disorders” napisali: “To nowe stadium badawcze pozostawia niewiele wątpliwości, że istnieje ścisły przyczynowy związek pomiędzy poddaniem się działaniu rtęci z konserwowanych thimerosalem produktów biologicznych (szczepionki oraz produkty Rho(D)) a zatruciem rtęcią diagnozowanym jako choroba spektrum autystycznego (ASD). Thimerosal (49,55% rtęci – wagowo) jest wysoce toksycznym związkiem rtęci stosowanym jako konserwant w niektórych lekach pozaobiegowych oraz wypisywanych na receptę, włącznie z większością zastrzyków na gripę podawanych kobietom w ciąży, niemowlętom, dzieciom, dorosłym i osobom starszym”.

Okazuje się, że szczepionki są nie tylko zasadniczo bezużyteczne, ale na dodatek te zawierające rtęć są zdecydowanie szkodliwe dla dzieci. Jednakże, media głównego nurtu nie tylko kontynuują negowanie istnienia związku między rtęcią a zaburzeniami neurologicznymi, ale próbują przekonać opinię publiczną, że jest to nieprawda.

Autorstwo: Richard Stossel

Na podstawie: NCBI.nlm.nih.gov, MedicalNewsToday.com, NaturalNews.com, CID.OxfordJournals.org

Źródło oryginalne: NaturalNews.com

Źródło polskie: Wolna-Polska.pl