

# Udar mózgu i krwotok w mózgu u 7-letniej dziewczynki

6 grudnia 2021

Strona [HealthImpactNews.com](https://www.healthimpactnews.com) informuje, że Barry Gewin z Pensylwanii [napisał na „Facebooku”](#), że jego siostrzenica Harper została niedawno zabrana na OIOM z powodu udaru mózgu i krwotoku w mózgu, 7 dni po otrzymaniu zastrzyku preparatu Pfizera na COVID-19. W pewnym momencie opublikował aktualizację informacji wraz z krótkim filmem stwierdzającym, że Harper znów zaczyna chodzić, ale w kolejnym doniósł, że ponownie straciła przytomność. Według jego brata przestała jeść, pić, siedzieć i chodzić. Nie podaje wieku swojej siostrzenicy, ale we wcześniejszych komentarzach wspominał, że ma 7 lat.

Strona [ChildrensHealthDefense.org](https://www.childrenshealthdefense.org) informuje, że CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom) opublikowało nowe dane, z których wynika, że w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 26 listopada 2021 r. do Systemu Zgłaszania Zdarzeń Niepożądanych Poszczepiennych (VAERS) zgłoszono łącznie 927 740 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych skutków ubocznych po szczepionkach przeciwko COVID-19. Dane obejmowały łącznie 19 532 zgłoszeń zgonów – wzrost o 283 w porównaniu z poprzednim tygodniem – i 146 720 zgłoszeń poważnych obrażeń, w tym zgonów, w tym samym okresie – wzrost o 3325 w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Włączając do danych VAERS „raporty zagraniczne”, w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 26 listopada 2021 r. w Stanach Zjednoczonych zgłoszono 672 373 zdarzenia niepożądane, w tym 8986 zgonów i 57 143 poważnych obrażeń. „Raporty zagraniczne” to zgłoszenia otrzymane przez amerykańskich producentów od ich zagranicznych spółek zależnych. Zgodnie z przepisami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), jeśli producent zostanie powiadomiony o zgłoszeniu przypadku za granicą, producent jest zobowiązany do zgłosić je do VAERS.

Spośród 8986 zgonów w Stanach Zjednoczonych zgłoszonych na dzień 26 listopada, 20% wystąpiło w ciągu 24 godzin od szczepienia, 26% w ciągu 48 godzin, a 61% po 48 godzinach. W Stanach Zjednoczonych do 24 listopada podano 454 miliony dawek szczepionki przeciw COVID-19. Obejmują one 264 miliony dawek Pfizera, 173 miliony dawek Moderny i 16 milionów dawek Johnson & Johnson (J&J).

Nowe dane VAERS dotyczące dzieci w wieku od 5 do 11 lat ukazują 2586 zdarzeń niepożądanych, w tym 34 oceniono poważnych, oraz 2 zgony. Pierwszą ofiarą śmiertelną jest 11-letnia dziewczynka z Georgii zaszczepiona 14 września (przed dopuszczeniem stosowania preparatu Pfizera w grupie wiekowej od 5 do 11 lat), a drugą jest 5-letnia dziewczynka, która zmarła cztery dni po otrzymaniu pierwszej dawki Pfizera.

Dane dotyczące dzieci w wieku od 12 do 17 lat ukazują 23 871 zdarzeń niepożądanych, w tym 1453 poważnych i 31 zgonów. Ostatnia śmierć dotyczy 16-letniej dziewczynki z Georgii, która zmarła oficjalnie z powodu choroby serca i niewydolności wielonarządowej dwa dni po otrzymaniu preparatu Pfizera. 60 doniesień dotyczy anafilaksji zagrażających życiu, które wymagały leczenia lub doprowadziły do śmierci, z czego 96% przypadków związanych jest z preparatem Pfizera. 563 doniesień mówi o zapaleniu mięśnia sercowego i zapaleniu osierdzia (zapalenie serca), z czego 553 przypadków dotyczy dzieci, które przyjęły preparat firmy Pfizer. 139 doniesień informuje o zaburzeniach krzepnięcia krwi, przy czym wszystkie przypadki przypisano Pfizerowi.

Dane VAERS dla wszystkich grup wiekowych łącznie pokazują 19% zgonów związanych z zaburzeniami serca, 54% zmarłych to mężczyźni a 42% to kobiety (pozostałe zgłoszenia nie zawierały informacji o płci osoby zmarłej), średni wiek zgonów pacjentów to 72,7 lat, 4480 kobiet w ciąży zgłosiło skutki uboczne (w tym 1411 dotyczy poronień lub przedwczesnych porodów), 3219 przypadków porażenia Bella (51% – Pfizer, 41% – Moderna, 8% – J&J), 764 doniesień o zespole Guillaina-Barrégo (42% – Pfizer,

29% – Moderna, 27% – J&J), 2163 przypadki anafilaksji (zagrożały zdrowiu, wymagały leczenia lub doprowadziły do zgonów), 11 334 doniesień o zaburzeniach krzepnięcia krwi (5024 – Pfizer, 4037 – Moderna, 2222 – J&J), 3257 przypadków zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia (2025 – Pfizer, 1085 – Moderna, 137 – J&J).

Preparaty na COVID-19 zabijają więcej dzieci niż choroba COVID-19. Jak informuje CDC – w pierwszych miesiącach 2021 roku (późniejszych danych jeszcze nie opublikowano), w czasie „szczytu pandemii”, na COVID-19 nie zmarła w Stanach Zjednoczonych ani jedna osoba w wieku 12-17 lat. Za to po rozpoczęciu kampanii „szczepień” preparatem genetycznym nastąpił nagły wzrost zgonów, paraliżów i różnych chorób u „zaszczepionej” młodzieży. Stawia to sens podawania preparatów dzieciom i młodzieży pod wielkim znakiem zapytania.

Opracowanie: Maurycy Hawranek

Na podstawie: [ChildrensHealthDefense.org](https://ChildrensHealthDefense.org),  
[HealthImpactNews.com](https://HealthImpactNews.com), [Bibula.com](https://Bibula.com)

Źródło: WolneMedia.net