

UE bada Gardasil po fali poważnych skutków ubocznych

19 grudnia 2015

Tak wiele dziewcząt doświadcza strasznych problemów zdrowotnych po szczepionce z Gardasilu przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), że Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła plany przeprowadzenia wnikliwego przeglądu bezpieczeństwa tej kontrowersyjnej szczepionki.

Po ostatnim przeglądzie dokumentu w Danii wskazującego na falę skutków zdrowotnych związanych z Gardasilem, władze europejskie rzekomo rozważają podawanie tej szczepionki, która wydaje się wywoływać stałe szkody dla zdrowia u wielu zaszczepionych dziewcząt. Jak poinformował duński „The Local”, EMA chce dodatkowego przeglądu Gardasilu w celu „dalszego wyjaśnienia aspektów bezpieczeństwa szczepionki”.

Zdaniem EMA, około 72 mln młodych kobiet zaszczepiono Gardasilem od czasu wprowadzenia go w Europie w 2006. Wiele z tych kobiet informowało o skutkach ubocznych począwszy od drgawek i omdleń po problemy z sercem i chronicznym zmęčeniem. Do tej pory ponad 100 duńskich dziewcząt złożyło wnioski o rekompensatę finansową za szkody wywołane przez Gardasil. Trzy z nich, jak informuje szwedzki dziennik Svenska Dagbladet, już otrzymały amerykański odpowiednik około 593 000 dolarów. Kolejne 800 dziewcząt poinformowało o skutkach ubocznych, ale nie wnioskowały jeszcze o kompensatę.

„Zarówno [europejska] komisja ds. skutków ubocznych i Duński Urząd Zdrowia i Leków szacuje, że zalety szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy są większe niż wady i nadal zalecają ją młodym dziewczynom” – powiedziała mediom duńska minister zdrowia Sophie Lohde. „Ale dla mnie jest ważne, że ludzie reagują, gdy nadal pojawiają się nowe doniesienia o skutkach ubocznych i jest też niepokój wśród wielu dziewcząt i ich

rodzin. Do tego musimy podchodzić poważnie”.

Gardasil nie jest jedyną badaną szczepionką na HPV – wszystkie trzy obecnie na rynku, w tym Gardasil (Merck & Co.), Gardasil 9 i Cervarix (GlaxoSmithKline) są badane pod względem bezpieczeństwa przez Europejską Agencję Leków (EMA). Wśród badanych skutków jest wiele raportów o posturalnym ortostatycznym zespole tachykardii (POTS), chorobie obejmującej zaburzenia rytmu serca, między rytmem kiedy poszkodowany siedzi lub stoi. Choroba ta może prowadzić do zawrotów głowy, omdlenia, bólu głowy, osłabienia i bólu w klatce piersiowej. Inne choroby obejmują złożony zespół miejscowego bólu (CRPS), który wpływa na normalne używanie własnych kończyn. Wiele dziewcząt, które już zgłaszały niepożądane skutki po szczepionce przeciwko HPV, mówią że ich mięśnie są słabe i nie mogą już być tak aktywne fizycznie, jak przed szczepionką.

Celem przeglądu EMA jest ustalenie, czy istnieje uzasadniony związek przyczynowy pomiędzy szczepionką HPV i tymi chorobami. Agencja twierdzi, że te i inne objawy mogą wystąpić „u osób nieszczepionych”, a przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Ale osoby, które doznały szkód wiedzą, że szczepionka była przyczyną i nie zamierzają się poddać, dopóki nie ujawni się prawdy. Wbrew temu co twierdzą władze o szczepionkach HPV iż są „bardzo bezpieczne,” osoby które już odczuły niekorzystne skutki znają prawdę.

„Po licencjonowaniu Gardasilu i zaleceniu 3 dawek dla 11-12-latek i młodych kobiet, były tysiące doniesień o nagłej utracie świadomości w ciągu 24 godzin” – informuje Krajowe Centrum Informacji o Szczepionkach (NVIC). Inne niepożądane skutki to „drgawki, bóle mięśni i osłabienie, obezwładniające zmęczenie, zespół Guillain-Barre (GBS), paraliż twarzy, zapalenie mózgu, reumatoidalne zapalenie stawów; łupus, zakrzepy, zapalenie nerwu wzrokowego, stwardnienie rozsiane, udary i inne poważne problemy zdrowotne, łącznie ze śmiercią, po otrzymaniu szczepionki Gardasil”.

Autorstwo: Jonathan Benson

Tłumaczenie: Ola Gordon

Źródło oryginalne: NaturalNews.com

Źródło polskie: Wolna-Polska.pl