

Wzrost paraliżów po szczepieniach przeciwko polio

17 lutego 2013

Liczba przypadków niepoliowego ostrego porażenia wiotkiego, bardziej znanego jako AFP (acute flaccid paralysis) znacząco wzrosła w Indiach po masowych szczepieniach przeciwko polio (choroba Heinego-Medina) za pomocą doustnej szczepionki (OPV) podawanej w ramach szeroko nagłaśnianego programu zwalczania tej choroby.

Według raportu dra Neetu Vashishta i dra Jacoba Puliyela opublikowanego w kwietniowo-czerwcowym numerze „Indian Journal of Medical Ethics” częstość występowania niepoliowego AFP po rozpoczęciu 10 lat temu podawania szczepionki OPV wzrosła 12 razy ponad naturalną częstość występowania tej choroby.

Dr Puliyel, który jest również członkiem Krajowej Technicznej Grupy Doradczej ds. Szczepień oraz Roboczego Zespołu ds. Leków i Zasad Żywnościowych Dwunastego Planu Pięcioletniego powiedział, że wystąpił wyraźny związek pomiędzy wzrostem liczby przypadków AFP i irracjonalnie podawaną szczepionką OPV.

Uważa, że ryzyko zachorowania dzieci poniżej 15 roku życia na niepoliowe ostre porażenie wiotkie (AFP) wynosi w naturalnych warunkach od 1 do 2 przypadków na 100 000. Obecnie częstość występowania AFP w Indiach” jest 12 razy wyższa od oczekiwanego”. W roku 2011 niepoliowego AFP doznało dodatkowe 47 500 dzieci ponad standardową liczbę.

Źródło oryginalne: Deccan Chronicle, Indie, 14.04.2012

Źródło polskie: [„Nexus” nr 6 \(86\) 2012](#)