

Wzrost śmiertelności dzieci w Europie o 63060%

2 lipca 2023

Niedawna analiza przeprowadzona przez EuroMOMO, organizację, której powierzono oficjalne dane statystyczne z 26 z 44 krajów europejskich, ujawniła, że istnieje bezpośredni związek między zatwierdzeniem szczepionki Pfizera na COVID-19 dla dzieci a wzrostem liczby zgonów wśród dzieci. Wykazała ona oszałamiający wzrost liczby zgonów wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat o 63 060 procent! Dane obejmują okres od momentu, gdy EMA (Europejska Agencja Leków) w „trybie pilnym” zatwierdziła preparat mRNA firmy Pfizer do stosowania u dzieci, do 22 tygodnia 2023 roku.

Raport niezależnego serwisu informacyjnego „Expose” przedstawia wykres obejmujący okres od 3 stycznia do 27 marca 2022 r. i zawiera całkowitą liczbę przypadków SARS-CoV-2 podzielonych na kategorie według statusu szczepień i grupy wiekowej w Anglii. „Dane, zaczerpnięte z raportu [»COVID-19 Vaccine Surveillance Report«](#) Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) tydzień 5, (strona 43), tydzień 9 (strona 41) i tydzień 13 (strona 41), nakreśliły żywy obraz niepokojącej rzeczywistości” – donosi „Expose”.

Inny opublikowany wykres przedstawia wskaźniki zachorowań na 100 000 osób, również w podziale na status szczepień i grupę wiekową w kraju. Wykres pokazał alarmujący, gwałtowny wzrost liczby przypadków wśród populacji potrójnie zaszczepionej w każdej grupie wiekowej.

W 21 tygodniu 2021 r. EMA rozszerzyła szczepionki Pfizera na COVID-19 najpierw na dzieci w wieku od 12 do 15 lat, a następnie na grupę wiekową od 5 do 11 lat. Od tego momentu zaobserwowano szokujący wzrost liczby zgonów wśród dzieci. W okresie od 22 do 52 tygodnia 2021 r. odnotowano zaskakującą

liczbę 919 nadmiernych zgonów wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat w porównaniu z tygodniem od 1 do 21, w którym odnotowano o 218 zgonów mniej, niż się spodziewano.

Niefortunny trend utrzymywał się przez cały 2022 r., z łączną liczbą 1639 zgonów wśród dzieci w wieku od 0 do 14 lat w 26 krajach europejskich. Odkąd EMA rozszerzyła szczepionki Pfizera na COVID-19 na dzieci, na całym kontynencie odnotowano 3148 nadmiernych zgonów wśród dzieci.

W czasie tzw. pandemii COVID-19 okazało się, że wirus SARS-CoV-2 oszczędzał młodsze pokolenie, dlatego poszerzenie wyszczepiania „w trybie pilnym” preparatu mRNA na dzieci było mocno krytykowane. Krytycy zastanawiali się, dlaczego unijne organy ds. zdrowia musiały rozszerzyć zakres szczepień na dzieci, skoro nie było dla nich bezpośredniego zagrożenia.

„Ostatecznym celem nie mogło być powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ realne dane ujawniły, że populacja zaszczepiona przeciwko COVID-19 wydawała się wykazywać większe prawdopodobieństwo zakażenia wirusem i jego roznoszenia, w porównaniu z osobami niezaszczepionymi. Sama »tarcza«, która miała chronić przed wirusem, wydawała się nie spełniać swojej misji” – wskazano w artykule „Expose”.

Autorstwo: Belle Carter

Tłumaczenie: Maurycy Hawranek

Na podstawie: Expose-News.com, EMA.Europa.eu [\[1\]](#) [\[2\]](#), Gov.uk

Źródło zagraniczne: NaturalNews.com

Źródło polskie: WolneMedia.net