

Zażywanie paracetamolu w ciąży wiąże się z dużym ryzykiem

1 listopada 2017

Norwescy naukowcy zbadali, jak zażywanie paracetamolu przez kobiety w ciąży wpływa na rozwój ich dzieci. Okazało się, że przyjmowanie paracetamolu przez przynajmniej 29 dni w trakcie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu ADHD o ponad 200 proc.!

Norwescy naukowcy nie mają wątpliwości, że zażywanie paracetamolu w ciąży jest powiązane z ryzykiem wystąpienia u dziecka ADHD (dosłownie zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi), czyli zespołu neurorozwojowych zaburzeń psychicznych, który objawia się m.in. problemem ze skupieniem uwagi, hiperaktywnością, nadpobudliwością ruchową i impulsywnością. Naukowcy wykazali, że u kobiet, które przyjmowały paracetamol dłużej niż przez 29 dni w trakcie ciąży, ryzyko urodzenia dziecka z ADHD było o 220 proc. wyższe, niż u kobiet, które paracetamolu nie zażywały w ogóle, albo które sięgały po tę substancję sporadycznie.

W badaniu wzięło udział 112 973 dzieci (w tym 2 246 ze zdiagnozowanym ADHD), a także 95 242 matek i 75 217 ojców. Blisko 47 proc. przebadanych matek przyznało, że w czasie ciąży zażywało paracetamol – 27 proc. z nich sięgnęło po substancję w jednym tylko trymestrze, 16 proc. – w trakcie dwóch trymestrów, a 4 proc. w każdy z trzech trymestrów. Jak wykazali naukowcy, u kobiet, które zażywały paracetamol w trakcie jednego trymestru, ryzyko urodzenia dziecka z ADHD było większe o 7 proc., u kobiet, które zażywały paracetamol w trakcie dwóch trymestrów – o 22 proc., a u kobiet, które sięgnęły po tę substancję na przestrzeni całej ciąży – o 27 proc. Z kolei u kobiet, które zażyły paracetamol mniej niż 8

razy w trakcie całej ciąży, ryzyko urodzenia dziecka z ADHD było o 10 proc. mniejsze.

Krytycy wskazują jednak, że badania naukowców z Norwegii nie zostały przeprowadzone w ramach eksperymentu kontrolowanego, dlatego nie można z nich wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Norwegowie nie wzięli na przykład po uwagę faktu, że potrzeba dłuższego przyjmowania przez kobiety w ciąży paracetamolu może wskazywać na poważniejszą chorobę. I to właśnie ta choroba/przypadłość, a nie paracetamol, mogła bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie ryzyka urodzenia dziecka z ADHD.

Źródło: PolishExpress.co.uk